

Umfrage von BDOC, BVA, DGII, DOG zur Intraokular-Chirurgie 2017

- | | | |
|--|--|--|
| 1. Wir/ich operierten im Jahr 2017 als | - niedergelassener KV-Arzt in privatem OP <input type="checkbox"/>
- niedergelassener KV-Arzt an öffentlicher Klinik <input type="checkbox"/>
- beamteter/angestellter Arzt an öffentlicher Augenklinik im Krankenhausbedarfsplan <input type="checkbox"/> | |
| 2. Wie viele Ärzte operierten in Ihrem Team intraokular? | _____ | |
| 3. Wir/ich operierten im Jahr 2017 an verschiedenen Orten | | <input type="checkbox"/> |
| | stationär | ambulant |
| 4. Wie viele Kataraktoperationen führten Sie durch?
- wie viele davon mit dem Femtosekundenlaser? | _____
_____ | _____
_____ |
| 5. Wie viele Pars-Plana-Vitrektomien führten Sie durch? | _____ | _____ |
| 6. Wie viele Glaukome haben Sie operiert? | - filtrierend (z. B. Trabekulektomie) _____
- nicht filtrierend (z. B. am Schlemm) _____
- Laser-Zyklo-Destruktion _____
- wie viele davon erhielten MIGS-Implantate? _____ | _____

_____ |
| 7. Wie viele Keratoplastiken führten Sie durch?
- wie viele davon waren DMEK? | _____
_____ | _____
_____ |
| 8. Welche Anästhesie bevorzugten Sie bei Kataraktoperationen? | - topisch (Tropf, intracameral, s.c.) _____
- Injektion (Peri / Retrobulbär) _____
- ITN/Rauschnarkose _____ | <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> |
| 9. Wie viele IVOM haben Sie durchgeführt? | - Avastin®, Bevacizumab _____
- Eylea® Aflibercept _____
- ausgeeinzeltes Aflibercept _____
- Lucentis®, Ranibizumab _____
- ausgeeinzeltes Ranibizumab _____
- Ozurdex®, Dexamethason _____
- andere () _____ | _____

_____ |
| 10. Welche Presbyopielinsen bevorzugten Sie? | - diffraktiv-multifokal _____
- EDoF-Linsen (Extended Depth of Focus) _____
- andere () _____ | <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> |
| 11. Bei wie vielen Patienten haben Sie Monovision zur Presbyopiekorrektur angestrebt? | _____ | |
| 12. Wie oft haben Sie implantiert: | - torische IOL (monofokal) _____
- torische Presbyopie-IOL _____
- Presbyopie-IOL, nicht torisch _____ | _____

_____ |
| 13. Waren Ihre Patienten mit Presbyopielinsen überwiegend primäre | - Kataraktpatienten <input type="checkbox"/>
- refraktive Patienten <input type="checkbox"/> | |
| 14. Eine 75-jährige Kataraktpatientin, bds. myoper Hornhautastigmatismus 1,75 dpt (0°), eigentlich nie Brille getragen, Führerschein vor 30 Jahren ohne Gutachten, möchte weitgehend ohne Brille leben. Was empfehlen Sie? | - Belassen des Astigmatismus, Pseudoakkommodation <input type="checkbox"/>
- torische Multifokallinse <input type="checkbox"/>
- torische IOL, Monovision <input type="checkbox"/> | |
| 15. Wie viele primäre refraktive Eingriffe haben Sie durchgeführt? | - LASIK (Keratom) _____
- LASIK (Femto-Flap-Präparation) _____
- Femto-Lentikelextraktion (ReLEx®, SMILE) _____
- LASEK, PRK _____
- refraktiver Linsenaustausch _____
- phake Implantate _____
- andere () _____ | _____

_____ |

E R I N N E R U N G

Bitte schicken Sie die Antwort kurzfristig an Fax-Nr. 0651 / 99 84 99 19 oder 02771 / 87 17 80